

GEBRAUCHSINFORMATION

Nystatin Dechra

100.000 I.E./ml

Suspension zum Eingeben für Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen oder Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere

NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

Dechra Veterinary Products GmbH
Deutschland, Hauptstraße 6 - 8, 88326 Aulendorf, Deutschland

FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICHER HERSTELLER

Biokanol Pharma GmbH, Kehler Straße 7, 76437 Rastatt, Deutschland

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nystatin Dechra 100.000 I.E./ml Suspension zum Eingeben für Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen oder Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere

WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Wirkstoff: 100.000 I.E. Nystatin
Sonstige Bestandteile: Saccharose
Gelbe Suspension mit Geruch und Geschmack nach Himbeere.

ANWENDUNGSGEBIET(E)

Hefepilzinfektionen im Magen-Darmtrakt.

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

ZIELTIERART(EN)

Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen oder Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere.

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Schmackhafte Suspension zum Eingeben.



Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen, Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere: 1 ml/kg Körpergewicht 2-mal täglich über 14 Tage vorzugsweise über schmackhaftes Futter verabreichen oder mit einer Einzelspritze in den Mund des Tieres eingeben.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Zur Entnahme der Suspension Verschlusskappe abdrehen.

Originalpackung mit 48 ml Suspension (mit Dosierpumpe): 1 Hub entspricht 0,5 ml. 2 Hübe entsprechen 1 ml.

Flasche nach Entnahme verschließen.

WARTEZEIT(EN)

Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.

Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Für Tiere mit Diabetes mellitus ist der Gehalt an Saccharose zu beachten.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

WEITERE ANGABEN

Originalpackung mit 48 ml Suspension in einer Braunglasflasche mit Dosierpumpe im Faltpapier.

SJ210904



Product: Nystatin Dechra - 100.000 I.E./ml - DE - Leaflet

Dimensions:..... 80 mm x 220 mm

Primary brand name font size:25pt

Primary brand description font size:15pt

Body text font size:10pt

Item code:SJ210904

Pharmacode: N/A

Proof:

3.1 (JP)
3.2 (JP)

Date:

05-03-2024
12-03-2024

Proof:

Date:

Pantone reference guide

Colours to be printed:

BLACK

Do not print

CUTTER GUIDE

STYLE DEVIATIONS

Logo size is bigger than 1/7 of Leaflet width. Because the leaflet width is only 80 mm, the logo would look too small.

REGULATORY AUTHORITIES' REQUESTS

