

## GEBRAUCHSINFORMATION

# Amoxi-Sleecol® 800 mg

Tabletten zur intrauterinen Anwendung

Für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe

Amoxicillin-Trihydrat

---

### NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH  
Hauptstraße 6 – 8  
88326 Aulendorf

### BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Amoxi-Sleecol® 800 mg Tabletten zur intrauterinen Anwendung für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe  
Amoxicillin-Trihydrat

### WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

Amoxicillin-Trihydrat 800 mg (entspr. 696,8 mg Amoxicillin)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid

Weiß bis gelblich-weiß, längliche Tablette mit einseitiger Bruchrille. Die Tablette kann in zwei gleiche Hälften geteilt werden.

### ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Behandlung von folgenden durch grampositive und/oder gramnegative Amoxicillin-empfindliche Keime hervorgerufene Krankheiten:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf:

Infektionen des Endometriums

Nachgeburtshaltung

### GEGENANZEIGEN

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren.

Schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie.

Vorliegen von  $\beta$ -Lactamase-bildenden Erregern.

### NEBENWIRKUNGEN

Der Gebrauch von Penicillinen, so auch von Amoxicillin, kann allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Anaphylaxie) auslösen.

Nach Auftreten einer allergischen Reaktion darf keine Wiederholung der Behandlung mit Amoxi-Sleecol 800 mg erfolgen, und die unter dem Passus „Hinweise für den Fall der Überdosierung“ genannten Gegenmaßnahmen sind zu ergreifen.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### ZIELTIERARTEN

Rinder, Pferde, Schafe und Schweine

### DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur intrauterinen Anwendung

Pferd: 800 mg Amoxicillin-Trihydrat entsprechend 1 Tablette

Rind: 800 mg Amoxicillin-Trihydrat, entsprechend 1 Tablette

Schaf und Schwein: 400 mg Amoxicillin-Trihydrat, entsprechend ½ Tablette

Falls erforderlich, Wiederholung nach 48 Stunden.



Sollte nach 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung eingetreten sein, so wird die Fortsetzung der Behandlung mit Amoxicillin nur nach Sicherstellung der Erregersensitivität durch ein Antibiogramm empfohlen; gegebenenfalls ist eine Therapieumstellung erforderlich.

#### **HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Der direkte Kontakt des Arzneimittels mit der Haut oder den Schleimhäuten des Anwenders ist wegen der Gefahr einer Sensibilisierung zu vermeiden.

#### **HINWEISE FÜR DEN FALL DER ÜBERDOSIERUNG**

Nach Überdosierungen können sowohl allergische Reaktionen als auch zentralnervöse Erregungserscheinungen und Krämpfe auftreten. Amoxi-Sleecol 800 mg ist sofort abzusetzen, und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln.

Es ist kein spezifisches Antidot bekannt.

Bei Anaphylaxie: Adrenalin und Glukokortikoide i.v.

Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistaminika und/oder Glukokortikoide.

Bei Krämpfen: Gabe von Barbituraten.

#### **WARTEZEIT**

<u>Pferd:</u>	Essbare Gewebe:	4 Tage
	Milch:	1 Tag
<u>Rind:</u>	Essbare Gewebe:	4 Tage
	Milch:	1 Tag
<u>Schwein:</u>	Essbare Gewebe	4 Tage
<u>Schaf:</u>	Essbare Gewebe:	4 Tage
	Milch:	1 Tag

#### **BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 30 °C lagern.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

#### **BESONDERE WARNHINWEISE**

Wechselwirkungen: Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein potentieller Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit rasch einsetzender bakteriostatischer Wirkung.

#### **BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

#### **GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

07.05.2018

#### **WEITERE ANGABEN**

Packungsgrößen:

Packung mit 10 Tabletten

Packung mit 20 Tabletten

Packung mit 50 Tabletten

Packung mit 100 Tabletten

Packung mit 200 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.